
PROTOCOLO
DESINFECCIÓN
COVID-19
quicesa
watercare
Aquatic
INGENIERÍA Y PROYECTOS


A
C
COMUNIDAD DE VECINOS
PROTOCOLO DESINFECCIÓN
Multisuperficies
Suelos y superficies
Multiusos con lejía
Cocinas y baños limpiador clorado
Gel WC
Clorix Hipo
Lineo
AG-500
BH-300
Antimoho y manchas de humedad

Recomendaciones y pautas generales

	ÁREAS DE LA INSTALACIÓN									
EQUIPOS-ACCESORIOS	**RECEPCIÓN / ENTRADA**	**ASEOS VESTUARIOS**	**ZONAS DE PASO COMUNES**	**SOLARIUM**	**PLAYA-VASO**	**ZONA AGUA**	**SALA SOCORRISTA**	**MATERIAL DEPORTIVO ACUÁTICO**	**SALA FITNESS**	**DEPURADORA**
CONTROL DE ACCESO AFORO TORNO	X	X		X	X	X			X	
DISPENSADORES GEL HIDROALCOHÓLICOS										
Sobremesa	X						X			
Colgar		X	X							X
Pie	X	X	X	X	X				X	
GEL HIDROALCOHÓLICO										
GENERADOR DE OZONO portátil	X	X	X(*)		X (**)				X	
CONTROL DE TEMPERATURA									X	
Termómetros fijo	X		X							
Termómetros portátil	X						X			
MOCHILAS PULVERIZADORAS	X		X	X	X			X		
ALFOMBRILLAS ACCESOS desinfección calzado	X			X	X (**)				X	
EQUIPOS UV portátiles		X	X			X			X	
CORCHERAS PARA DELIMITAR SECTORES DE BAÑO						X		X		

(*) Zonas de paso en clubs deportivos cerrados

(**) En piscinas cubiertas

PROTOCOLO DESINFECCIÓN COVID-19

quicesa watercare

PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN - Agua

ÁREA	PRODUCTO	MODO DE EMPLEO	EQUIPO	PRECAUCIONES
AGUA 	**CLORIX HIPO** 	Dosificar automáticamente para mantener los niveles entre 1,5 y 2 ppm	PANEL DE CONTROL 	Peligros EPIs 
	AG-500 	Incorporar diariamente con dosificación automática 500ml por cada 100m3 al día	SISTEMA AG 	Peligros EPIs 
	BH-300 	Incorporar en función de la naturaleza del agua, para mantener el rango entre 7,2 y 7,8		Peligros EPIs 
	Realización de analíticas	Realización de analíticas para controlar los niveles en el agua según el RD 742: - 3 controles diarios de Cloro y Ph - Analítica mensual del agua por un laboratorio externo - Control de niveles con el panel de dosificación		Peligros EPIs 
	Corcheras	Colocación de corcheras en el vaso para delimitar zonas de baño		Peligros EPIs 

MATERIAL AUXILIAR: CEPILLO, ESTROPAJO, BAYETA, GUANTES, CELULOSA, CUBO, FREGONA

INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA: 915 620 420

MÉTODOS DE APLICACIÓN DEL A.P.P.C.C.



PROTOCOLO DESINFECCIÓN COVID-19

quicesa watercare

PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN - ZONA DEPURADORA

ÁREA	PRODUCTO	USO	MODO DE EMPLEO	PRECAUCIONES
Filtros depuradora 	LINEO + CF-300  	Periodicidad: En la apertura Dosificación: Ver modo de empleo	Con piscina llena de agua: 1. Añadir 25kg / 100m^3 de CF-300 encima del lecho. Dejar actuar 4h y aclarar hasta pH neutro. 2. Añadir 10L/100m^3 de LINEO encima del lecho. Dejar actuar 1h y aclarar hasta ph neutro Con piscina vacía: 1. Añadir 25kg / 100m3 de CF-300 en el lecho, recircular depurando. Dejar actuar 4h y aclarar hasta pH neutro. 2. Añadir 10L/100m3 de LINEO encima del lecho. Dejar actuar 1h y aclarar hasta ph neutro Tiempo de contacto: No Aplica	Peligros EPIs 
Suelo 	SUELOS Y SUPERFICIES 5L SANICENTRO 	Periodicidad: Dos veces al día Dosificación: Diluido 1:40	1. Fregar con fregona y sistema de doble cubo. Dejar secar. Tiempo de contacto: 5m (bacterias y virus) 15m (hongos)	Peligros EPIs 
Puerta / Llaves Luz 	MULTISUPERFICIES SIN LEJIA SANICENTRO SPRAY 750ml 	Periodicidad: Cada 2/3h Dosificación: Directa RTU	1. Pulverizar la superficie y dejar actuar el tiempo recomendado. 2. Pasar un paño hasta dejarla completamente seca. Tiempo de contacto: 5m (bacterias y virus) 15m (hongos)	Peligros EPIs 
Válvulas 	MULTISUPERFICIES SIN LEJIA SANICENTRO SPRAY 750ml 	Periodicidad: Tras el uso Dosificación: Directa RTU	1. Pulverizar la superficie y dejar actuar el tiempo recomendado antes de aclarar. 2. Aclarar con agua. Tiempo de contacto: 5m (bacterias y virus) 15m (hongos)	Peligros EPIs 
Depósitos 	MULTISUPERFICIES SIN LEJIA SANICENTRO SPRAY 750ml 	Periodicidad: Tras el uso Dosificación: Directa RTU	1. Pulverizar la superficie y dejar actuar el tiempo recomendado antes de aclarar. 2. Aclarar con agua. Tiempo de contacto: 5m (bacterias y virus) 15m (hongos)	Peligros EPIs 

PROTOCOLO DESINFECCIÓN COVID-19

PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN - ZONA DEPURADORA

Garrafas	MULTISUPERFICIES SIN LEJIA SANICENTRO SPRAY 750ml	Periodicidad:	1. Pulverizar la superficie y dejar actuar el tiempo recomendado antes de aclarar. 2. Aclarar con agua.	Peligros	EPIs
		Tras el uso Dosificación: Directa RTU	Tiempo de contacto: 5m (bacterias y virus) 15m (hongos)		

MATERIAL AUXILIAR: CEPILLO, ESTROPAJO, BAYETA, GUANTES, CELULOSA, CUBO, FREGONA

INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA: 915 620 420

MÉTODOS DE APLICACIÓN DEL A.P.P.C.C.



PROTOCOLO DESINFECCIÓN COVID-19

quicesa watercare

ÁREA	FRECUENCIA
Filtros depuradora 	En la apertura
Suelo 	Dos veces al día
Puerta / Llaves Luz 	Cada 2/3h
Válvulas 	Tras el uso
Depósitos 	Tras el uso

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
M																															
T																															
N																															

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
M																															
T																															
N																															

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
M																															
T																															
N																															

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
M																															
T																															
N																															

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
M																															
T																															
N																															

PROTOCOLO DESINFECCIÓN COVID-19

Garrafas	Tras el uso
	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
M																															
T																															
N																															

M= MAÑANA T=TARDE N=NOCHE

MÉTODOS DE APLICACIÓN DEL A.P.P.C.C.



Nombre:

1-

2-

3-

PROTOCOLO DESINFECCIÓN COVID-19

quicesa watercare

PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN - SALA SOCORRISTA

ÁREA	PRODUCTO	USO	MODO DE EMPLEO	PRECAUCIONES
Botiquín 	MULTISUPERFICIES SIN LEJIA SANICENTRO SPRAY 750ml 	Periodicidad: Tras su uso Dosificación: Directo RTU	1. Pulverizar la superficie y dejar actuar el tiempo recomendado antes de aclarar. 2. Aclarar con agua. Tiempo de contacto: 5m (bacterias y virus) 15m (hongos)	Peligros  EPIs 
Camilla 	MULTISUPERFICIES SIN LEJIA SANICENTRO SPRAY 750ml 	Periodicidad: Tras su uso Dosificación: Directo RTU	1. Pulverizar la superficie y dejar actuar el tiempo recomendado antes de aclarar. 2. Aclarar con agua. Tiempo de contacto: 5m (bacterias y virus) 15m (hongos)	Peligros  EPIs 
Suelo 	COCINAS Y BAÑOS (LIMPIADOR CLORADO) 5L 	Periodicidad: Dos veces al día Dosificación: Diluido 1:40	1. Fregar con fregona y sistema de doble cubo. Dejar secar. Tiempo de contacto: 5m (bacterias y virus) 15m (hongos)	Peligros  EPIs 
Puerta 	MULTISUPERFICIES SIN LEJIA SANICENTRO SPRAY 750ml 	Periodicidad: Cada 2/3h Dosificación: Directo RTU	1. Pulverizar la superficie y dejar actuar el tiempo recomendado antes de aclarar. 2. Aclarar con agua. Tiempo de contacto: 5m (bacterias y virus) 15m (hongos)	Peligros  EPIs 

MATERIAL AUXILIAR: CEPILLO, ESTROPAJO, BAYETA, GUANTES, CELULOSA, CUBO, FREGONA

INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA: 915 620 420

MÉTODOS DE APLICACIÓN DEL A.P.P.C.C.



PROTOCOLO DESINFECCIÓN COVID-19

PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN - SALA SOCORRISTA

ÁREA	FRECUENCIA
Botiquín 	Tras su uso
Camilla 	Tras su uso
Suelo 	Dos veces al día
Puerta 	Cada 2/3h

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
M																															
T																															
N																															

M= MAÑANA T=TARDE N=NOCHE

Nombre:

1-

2-

3-


MÉTODOS DE APLICACIÓN DEL A.P.P.C.C.



PROTOCOLO DESINFECCIÓN COVID-19

quicesa watercare

PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN - BAÑOS / VESTUARIO

ÁREA	PRODUCTO	USO	MODO DE EMPLEO	PRECAUCIONES
Grifos / Lavabos 	MULTISUPERFICIES SIN LEJIA SANICENTRO SPRAY 750ml 	Periodicidad: Cada 2/3h Dosificación: Directo RTU	1. Pulverizar la superficie y dejar actuar el tiempo recomendado. 2. Pasar un paño hasta dejarla completamente seca. Tiempo de contacto: 5m (bacterias y virus) 15m (hongos)	Peligros EPIs
Papeleras 	MULTISUPERFICIES SIN LEJIA SANICENTRO SPRAY 750ml 	Periodicidad: Cada 2/3h Dosificación: Directo RTU	1. Pulverizar la superficie y dejar actuar el tiempo recomendado. 2. Pasar un paño hasta dejarla completamente seca. Tiempo de contacto: 5m (bacterias y virus) 15m (hongos)	Peligros EPIs
Inodoro 	GEL WC CON LELÍA FRESCOR CÍTRICO 1L 	Periodicidad: Cada 2/3h Dosificación: Directo RTU	1. Aplicar bajo el borde y las paredes del WC y dejar actuar 15 minutos. 2. Tirar de la cisterna. Tiempo de contacto: 5m (bacterias y virus) 15m (hongos)	Peligros EPIs
Duchas 	MULTISUSOS CON LEJIA SANICENTRO SPRAY 750ml 	Periodicidad: Cada 2/3h Dosificación: Directo RTU	1. Pulverizar la superficie y dejar actuar el tiempo recomendado. 2. Pasar un paño hasta dejarla completamente seca. Tiempo de contacto: 5m (bacterias y virus) 15m (hongos)	Peligros EPIs
Bancos 	MULTISUPERFICIES SIN LEJIA SANICENTRO SPRAY 750ml 	Periodicidad: Cada 2/3h Dosificación: Directo RTU	1. Pulverizar la superficie y dejar actuar el tiempo recomendado. 2. Pasar un paño hasta dejarla completamente seca. Tiempo de contacto: 5m (bacterias y virus) 15m (hongos)	Peligros EPIs
Taquillas 	MULTISUPERFICIES SIN LEJIA SANICENTRO SPRAY 750ml 	Periodicidad: Cada 2/3h Dosificación: Directo RTU	1. Pulverizar la superficie y dejar actuar el tiempo recomendado. 2. Pasar un paño hasta dejarla completamente seca. Tiempo de contacto: 5m (bacterias y virus) 15m (hongos)	Peligros EPIs

PROTOCOLO DESINFECCIÓN COVID-19

PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN - BAÑOS / VESTUARIO

Accesos



SUELOS Y SUPERFICIES 5L SANICENTRO



Periodicidad	Dosificación
En función de la afluencia y máximo 2h	Diluida 1:3

1. Diluir 250ml de producto y completar hasta un litro con agua.
2. Aplicar una cantidad suficiente para que la alfombra quede totalmente humedecida.
3. Procurar que al alfombra esté siempre humedecida

Tiempo de contacto: No aplica

Peligros EPIs





Suelos



COCINAS Y BAÑOS (LIMPIADOR CLORADO) 5L



Periodicidad	Dosificación
Dos veces al día	Diluido 1:40

1. Fregar con fregona y sistema de doble cubo. Dejar secar.


Tiempo de contacto: 5m (bacterias y virus) 15m (hongos)

Peligros EPIs





Puertas



MULTISUPERFICIES SIN LEJIA SANICENTRO SPRAY 750ml



Periodicidad	Dosificación
Cada 2/3h	Directo RTU

1. Pulverizar la superficie y dejar actuar el tiempo recomendado.
2. Pasar un paño hasta dejarla completamente seca.

Tiempo de contacto: 5m (bacterias y virus) 15m (hongos)

Peligros EPIs





MATERIAL AUXILIAR: CEPILLO, ESTROPAJO, BAYETA, GUANTES, CELULOSA, CUBO, FREGONA

INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA: 915 620 420

MÉTODOS DE APLICACIÓN DEL A.P.P.C.C.



PROTOCOLO DESINFECCIÓN COVID-19

PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN - BAÑOS / VESTUARIO

ÁREA	FRECUENCIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Grifos / Lavabos 	Cada 2/3h	M																														
		T																														
		N																														
Papeleras 	Cada 2/3h	M																														
		T																														
		N																														
Inodoro 	Cada 2/3h	M																														
		T																														
		N																														
Duchas 	Cada 2/3h	M																														
		T																														
		N																														
Bancos 	Cada 2/3h	M																														
		T																														
		N																														
Taquillas 	Cada 2/3h	M																														
		T																														
		N																														

PROTOCOLO DESINFECCIÓN COVID-19

PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN - BAÑOS / VESTUARIO

Accesos 	En función de la afluencia y máximo 2h	
Suelos 	Dos veces al día	
Puertas 	Cada 2/3h	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
M																															
T																															
N																															

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
M																															
T																															
N																															

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
M																															
T																															
N																															

M= MAÑANA T=TARDE N=NOCHE

Nombre:

1-

2-

3-




MÉTODOS DE APLICACIÓN DEL A.P.P.C.C.



PROTOCOLO DESINFECCIÓN COVID-19

quicesa watercare



PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN - ZONAS VASO

ÁREA	PRODUCTO	USO	MODO DE EMPLEO	PRECAUCIONES
Linea de Flotación 	LINEO 5L 	Periodicidad: Al final del día Dosificación: En función del grado de suciedad	Aplicar el producto directamente sobre la zona a tratar, dejar actuar unos minutos y frotar con una esponja o con el robot LINEO XP para arrastrar la suciedad. Aclarar con agua. Tiempo de contacto: 5 minutos	Peligros EPIs 
Rejilla 	LINEO + ANTIMOHO SANICENTRO 750ML 	Periodicidad: Al final del día Dosificación: Directo RTU	LIMPIAR: Aplicar Lineo sobre la zona a tratar, dejar actuar unos minutos y frotar con una esponja o con el robot LINEO XP para arrastrar la suciedad. Aclarar con agua. DESINFECTAR: Aplicar Sanicentro Antimoho sobre la zona, dejar actuar y aclarar con la ayuda de una manguera. Tiempo de contacto: 5m (bacterias y virus) 15m (hongos)	Peligros EPIs 
Playas 	COCINAS Y BAÑOS (LIMPIADOR CLORADO SANICENTRO 	Periodicidad: Al final del día Dosificación: Directo RTU	1. Aplicar el producto con cubo doble y a continuación aclarar con agua. Tiempo de contacto: 5m (bacterias y virus) 15m (hongos)	Peligros EPIs 
Corcheras 	LINEO + ANTIMOHO SANICENTRO 750ML 	Periodicidad: Principio y final temporada Dosificación: Directo RTU	LIMPIAR: Aplicar Lineo sobre la zona a tratar, dejar actuar unos minutos y frotar con una esponja o con el robot LINEO XP para arrastrar la suciedad. Aclarar con agua. DESINFECTAR: Aplicar Sanicentro Antimoho sobre la zona, dejar actuar y aclarar con la ayuda de una manguera. Tiempo de contacto: 5m (bacterias y virus) 15m (hongos)	Peligros EPIs 
Escaleras / Barandillas 	MULTISUPERFICIES SIN LEJIA SANICENTRO SPRAY 750ml 	Periodicidad: Diaria Dosificación: Directo RTU	1. Pulverizar la superficie y dejar actuar el tiempo recomendado. 2. Pasar un paño hasta dejarla completamente seca. Tiempo de contacto: 5m (bacterias y virus) 15m (hongos)	Peligros EPIs 
Duchas 	MULTISUPERFICIES SIN LEJIA SANICENTRO SPRAY 750ml 	Periodicidad: Diaria Dosificación: Directo RTU	1. Pulverizar la superficie y dejar actuar el tiempo recomendado. 2. Pasar un paño hasta dejarla completamente seca. Tiempo de contacto: 5m (bacterias y virus) 15m (hongos)	Peligros EPIs 

PROTOCOLO DESINFECCIÓN COVID-19

quicesa watercare

PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN - ZONAS VASO

Vallado Perimetral 	MULTISUPERFICIES SIN LEJIA SANICENTRO SPRAY 750ml 	Periodicidad: Diaria Dosificación: Directo RTU	1. Pulverizar la superficie y dejar actuar el tiempo recomendado. 2. Pasar la manguera para aclarar. Tiempo de contacto: 5m (bacterias y virus) 15m (hongos)	Peligros EPIs
Accesos 	SUELOS Y SUPERFICIES 5 SANICENTRO 	Periodicidad: En función de la afluencia y máximo 2h Dosificación: Diluida 1:3	1. Diluir 250ml de producto y completar hasta un litro con agua. 2. Aplicar una cantidad suficiente para que la alfombra quede totalmente humedecida. 3. Procurar que al alfombra esté siempre humedecida Tiempo de contacto: No aplica	Peligros EPIs
Silla Socorrista 	MULTISUPERFICIES SIN LEJIA SANICENTRO SPRAY 750ml 	Periodicidad: Al cambio de turno Dosificación: Directo RTU	1. Pulverizar la superficie y dejar actuar el tiempo recomendado. 2. Pasar un paño hasta dejarla completamente seca. Tiempo de contacto: 5m (bacterias y virus) 15m (hongos)	Peligros EPIs
Recoge Hojas , Pértiga 	MULTISUPERFICIES SIN LEJIA SANICENTRO SPRAY 750ml 	Periodicidad: Tras su uso Dosificación: Directo RTU	1. Pulverizar la superficie y dejar actuar el tiempo recomendado. 2. Pasar un paño hasta dejarla completamente seca. Tiempo de contacto: 5m (bacterias y virus) 15m (hongos)	Peligros EPIs
Torno Acceso 	MULTISUPERFICIES SIN LEJIA SANICENTRO SPRAY 750ml 	Periodicidad: Al cambio de turno Dosificación: Directo RTU	1. Pulverizar la superficie y dejar actuar el tiempo recomendado. 2. Pasar un paño hasta dejarla completamente seca. Tiempo de contacto: 5m (bacterias y virus) 15m (hongos)	Peligros EPIs
Salvavidas 	MULTISUPERFICIES SIN LEJIA SANICENTRO SPRAY 750ml 	Periodicidad: Diario Dosificación: Directo RTU	1. Pulverizar la superficie y dejar actuar el tiempo recomendado. 2. Pasar un paño hasta dejarla completamente seca. Tiempo de contacto: 5m (bacterias y virus) 15m (hongos)	Peligros EPIs

MATERIAL AUXILIAR: CEPILLO, ESTROPAJO, BAYETA, GUANTES, CELULOSA, CUBO, FREGONA

INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA: 915 620 420


MÉTODOS DE APLICACIÓN DEL A.P.P.C.C.



PROTOCOLO DESINFECCIÓN COVID-19

quicesa watercare

PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN - ZONAS VASO



ÁREA	FRECUENCIA
Linea de Flotación 	Al final del día
Rejilla 	Al final del día
Playas 	Al final del día
Corcheras 	Principio y final temporada
Escaleras / Barandillas 	Diaria
Duchas 	Diaria

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
M																															
T																															
N																															

PROTOCOLO DESINFECCIÓN COVID-19

quicesa watercare

PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN - ZONAS VASO

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Vallado Perimetral 	Diaria	M																														
		T																														
		N																														
Accesos 	En función de la afluencia y máximo 2h	M																														
		T																														
		N																														
Silla Socorrista 	Al cambio de turno	M																														
		T																														
		N																														
Recoge Hojas , Pértiga 	Tras su uso	M																														
		T																														
		N																														
Torno Acceso 	Al cambio de turno	M																														
		T																														
		N																														
Salvavidas 	Diario	M																														
		T																														
		N																														

M= MAÑANA T=TARDE N=NOCHE

MÉTODOS DE APLICACIÓN DEL A.P.P.C.C.



Nombre:


1-

2-

3-

PROTOCOLO DESINFECCIÓN COVID-19

PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN - SOLARIUM

				PRECAUCIONES
Tumbona, Mesa, Bancos 	MULTISUPERFICIES SIN LEJIA SANICENTRO SPRAY 750ml 	Periodicidad: Después de cada uso Dosificación: Directo RTU	1. Pulverizar la superficie y dejar actuar el tiempo recomendado. 2. Pasar un paño hasta dejarla completamente seca. Tiempo de contacto: 5m (bacterias y virus) 15m (hongos)	Peligros EPIs 
Sombrillas 	MULTISUPERFICIES SIN LEJIA SANICENTRO SPRAY 750ml 	Periodicidad: Después de cada uso Dosificación: Directo RTU	1. Pulverizar la superficie y dejar actuar el tiempo recomendado. 2. Pasar un paño hasta dejarla completamente seca. Tiempo de contacto: 5m (bacterias y virus) 15m (hongos)	Peligros EPIs 
Papeleras 	MULTISUPERFICIES SIN LEJIA SANICENTRO SPRAY 750ml 	Periodicidad: Al vaciarse Dosificación: Directo RTU	1. Pulverizar la superficie y dejar actuar el tiempo recomendado. 2. Pasar un paño hasta dejarla completamente seca. Tiempo de contacto: 5m (bacterias y virus) 15m (hongos)	Peligros EPIs 
Zona Infantil 	MULTISUPERFICIES SIN LEJIA SANICENTRO SPRAY 750ml 	Periodicidad: Cada 2/3h Dosificación: Directo RTU	1. Pulverizar la superficie y dejar actuar el tiempo recomendado. 2. Aclarar bien con un paño y agua. Tiempo de contacto: 5m (bacterias y virus) 15m (hongos)	Peligros EPIs 


MÉTODOS DE APLICACIÓN DEL A.P.P.C.C.



PROTOCOLO DESINFECCIÓN COVID-19

quicesa watercare

PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN - SOLARIUM

ÁREA	FRECUENCIA
Tumbona, Mesa, Bancos 	Después de cada uso
Sombrillas 	Después de cada uso
Papeleras 	Al vaciarse
Zona Infantil 	Cada 2/3h

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
M																															
T																															
N																															

M= MAÑANA T=TARDE N=NOCHE

Nombre:

1-

2-

3-

MÉTODOS DE APLICACIÓN DEL A.P.P.C.C.



PROTOCOLO DESINFECCIÓN COVID-19

quicesa watercare

PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN - ZONAS COMUNES COMUNIDAD

ÁREA	PRODUCTO	USO	MODO DE EMPLEO	PRECAUCIONES
Calles de acceso a Portales 	CLORIX HIPO 	Periodicidad: Diaria Dilución: 1:33	 1.Aplicar agua con manguera para eliminar suciedad y polvo 2.Incorporar 30ml (1 tapón) por cada litro de agua y aplicar mediante mochila de pulverización. Tiempo de contacto: Hasta dejar secar	Peligros EPIs 
Bancos 	MULTISUPERFICIES SIN LEJIA SANICENTRO SPRAY 750ml 	Periodicidad: Después de cada uso Dosificación: Directa RTU	 1. Pulverizar la superficie y dejar actuar el tiempo recomendado. 2. Pasar un paño hasta dejarla completamente seca. Tiempo de contacto: 5m (bacterias y virus) 15m (hongos)	Peligros EPIs 
Papeleras 	MULTISUPERFICIES SIN LEJIA SANICENTRO SPRAY 750ml 	Periodicidad: Al vaciarse Dosificación: Directa RTU	 1. Pulverizar la superficie y dejar actuar el tiempo recomendado. 2. Pasar un paño hasta dejarla completamente seca. Tiempo de contacto: 5m (bacterias y virus) 15m (hongos)	Peligros EPIs 
Columpios 	MULTISUPERFICIES SIN LEJIA SANICENTRO SPRAY 750ml 	Periodicidad: Cada 2/3h Dosificación: Directa RTU	 1. Pulverizar la superficie y dejar actuar el tiempo recomendado. 2. Aclarar bien con un paño y agua. Tiempo de contacto: 5m (bacterias y virus) 15m (hongos)	Peligros EPIs 
Parking 	CLORIX HIPO 	Periodicidad: Diaria Dosificación: 1:33	 1.Aplicar agua con manguera para eliminar suciedad y polvo 2.Incorporar 30ml (1 tapón) por cada litro de agua y aplicar mediante mochila de pulverización. Tiempo de contacto: Hasta dejar secar	Peligros EPIs 
Puertas 	MULTISUPERFICIES SIN LEJIA SANICENTRO SPRAY 750ml 	Periodicidad: Cada 2/3h Dosificación: Directa RTU	 1. Pulverizar la superficie y dejar actuar el tiempo recomendado. 2. Aclarar bien con un paño y agua. Tiempo de contacto: 5m (bacterias y virus) 15m (hongos)	Peligros EPIs 

PROTOCOLO DESINFECCIÓN COVID-19

PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN - ZONAS COMUNES COMUNIDAD

Interruptores



MULTISUPERFICIES SIN LEJIA SANICENTRO SPRAY 750ml



Periodicidad
Cada 2/3h
Dosificación
Directa RTU

1. Pulverizar la superficie y dejar actuar el tiempo recomendado.
2. Aclarar bien con un paño y agua.

Tiempo de contacto:	5m (bacterias y virus) 15m (hongos)

Peligros	EPIs

MATERIAL AUXILIAR: CEPILLO, ESTROPAJO, BAYETA, GUANTES, CELULOSA, CUBO, FREGONA



INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA: 915 620 420

MÉTODOS DE APLICACIÓN DEL A.P.P.C.C.



PROTOCOLO DESINFECCIÓN COVID-19

PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN - ZONAS COMUNES COMUNIDAD

ÁREA	FRECUENCIA	
Calles de acceso a Portales 	Diaria	
Bancos 	Después de cada uso	
Papeleras 	Al vaciarse	
Columpios 	Cada 2/3h	
Parking 	Diaria	
Puertas 	Cada 2/3h	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
M																															
T																															
N																															

PROTOCOLO DESINFECCIÓN COVID-19

PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN - ZONAS COMUNES COMUNIDAD

Interruptores	Cada 2/3h
	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
M																															
T																															
N																															

M= MAÑANA T=TARDE N=NOCHE

Nombre:

1-

2-

3-

MÉTODOS DE APLICACIÓN DEL A.P.P.C.C.



PROTOCOLO DESINFECCIÓN COVID-19

quicesa watercare

Aquatic INGENIERÍA Y PROYECTOS